

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷四十二

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勣

總校官中書臣朱鈐

校對官中書臣范鰲

謄錄監生臣張若湘

欽定四庫全書

備急千金要方卷四十一 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

心臟方

脉極第四

論方  
灸法

論曰凡脉極者主心也心應脉脉與心合心有病從脉起又曰以夏遇病為脉痺脉痺不已復感於邪內舍於心則飲食不為肌膚欬脫血色白不澤其脉空虛口唇

見赤色凡脉氣衰血焦髮墮以夏丙丁日得之於傷風損脉為心風心風之狀多汗惡風若脉氣實則熱熱則傷心使人好怒口為色赤甚則言語不快血脫色乾燥不澤飲食不為肌膚若脉氣虛則寒寒則欬欬則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痺故曰心風虛實候也若陽經脉病治陰絡陰絡脉病治陽經定其血氣各守其鄉脉實宜瀉氣虛宜補善治病者定其虛實治之取瘥病在皮毛肌膚筋脉則全治之若至六腑五臟則半死

矣

扁鵲云脉絕不治三日死何以知之脉氣空虛則顏焦  
髮落脉應手少陰手少陰氣絕則脉不通血先死矣  
生地黃煎治脉熱極則血氣脫色白乾燥不澤飲食不  
為肌膚消熱止極強胃氣方

生地黃汁

生麥門冬

赤蜜

各一升

蓴心

一升一作豉

遠志

二升

甘草

二兩

人參

茯苓

乾地黃

芍藥

白朮

各三兩

石膏

六兩

生薑蕤

四兩

右十三味十一味㕮咀以水一斗二升煮取二升七合去滓下地黃汁及蜜更煎三升五合分四服

灸法

胷中痛引腰背心下嘔逆面無滋潤灸上門隨年壯穴在俠巨關兩邊相去各半寸

一寸云

顏色焦枯勞氣失精

肩臂痛不得上頭灸肩髃百壯穴在肩外頭近後以手

按之有解宛宛中

脉虛實第五

論方  
針灸法

論曰凡脉虛者好驚跳不定脉實者洪滿凡脉虛實之應主於心小腸若其腑臟有病從熱生則應臟寒則應腑也

防風圓補虛調中治脉虛驚跳不定乍來乍去主小腸腑寒方

防風

桂心

通草

茯神

遠志

麥門冬

甘草

人參

白石英

各三兩

右九味為末白蜜和丸如梧子大酒服三十丸日再

加至四十丸

升麻湯治脉實洪滿主心熱病方

升麻

子芩

澤瀉

梔子仁

淡竹葉

芒硝

各三兩

生地黃

切一升

右七味㕮咀以水九升煮取三升去滓下芒硝分三

服



麻黃湯調心洩熱治心脉厥大寸口小腸熱齒齲噉痛  
方

麻黃

生薑

各四兩

細辛

子芩

茯苓

芍藥

各三兩

白朮

二兩

桂心

一兩

生地黄

切一升

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服須利  
加芒硝三兩甚善

針灸法

脉不出針不容穴在幽門兩傍各一寸五分是也

心悶痛上氣牽引小腸灸巨闕二七壯

心腹痛第六

論方蒸熨法  
灸法

論曰寒氣卒客於五臟六腑則發卒心痛胃痺感於寒  
微者為欬甚者為痛為泄厥心痛與背相引善瘕如物  
從後觸其心身傴僂者腎心痛也厥心痛腹脹滿心痛  
甚者胃心痛也厥心痛如以針錐刺其心心痛甚脾心  
痛也厥心痛色蒼蒼如死灰狀終日不得太息者肝心

痛也厥心痛卧若徒居心間痛動作痛益甚色不變者肺心痛也真心痛手足青至節心痛甚旦發夕死夕發旦死虵心痛心腹中痛發作腫聚往來上下行痛有休止腹中熱善涎出是虵咬也以手按而堅持之勿令得移以大針刺之復久持之蟲不動乃出心下針不可刺中有成聚不可取於輸腸中有蟲虵咬皆不可取以小針治寒熱氣卒客於五臟六腑中則發心痛方

大黃

芍藥

柴胡

各四兩

升麻

黃芩

桔梗

朱砂

各三兩

鬼箭羽

鬼臼

桂心

朴硝

各二兩

右十一味㕮咀以水九升煮取二升七合分三服先

分朱砂作三分每服內一分攪

止宜服後方

赤芍藥

六兩

桔梗

杏仁

各五兩

右三味㕮咀以水六升煮取三升分三服

九痛圓治九種心痛并療冷衝上氣落馬墮車血疾等

方一蟲心痛二注心痛三風心痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛九去來心痛此之謂九痛

附子

乾薑

各二兩

吳茱萸

人參

巴豆

各一兩

生狼毒

四兩

右六味為末蜜和丸如梧子大空腹服一丸卒中惡腹脹痛口不能言者二丸日一服連年積冷流注心胸者亦服之好好將息神驗

治九種心痛方

取當太歲上新生槐枝一握去兩頭呿咀以水三升煮取一升頓服

桂心三物湯治心中痞諸逆懸痛方

桂心

生薑

各二兩

膠飴

半斤

右三味取二味呿咀以水六升煮取三升去滓內飴

分三服

仲景用枳實五枚不用膠飴肘後用枳實五枚白朮二兩為五味

烏頭圓治心痛徹背背痛徹心方

烏頭

六銖

附子

半兩

蜀椒

半兩

乾薑

赤石脂

各一兩

右五味為末蜜丸如麻子大先食服三丸日三不知

稍增之

范汪不用附子服如梧子三丸崔氏用桂心半兩為六味

治心痛方

桃白皮煮汁空腹以意服之

崔氏用療  
疰心痛

治暴心痛或如中惡口中涎出不可禁止回回欲吐方

苦參

十斤

右一味㕮咀以水一石煮取二斗去滓下苦酒二斗

更煎取五升大且黃末熬和汁中煎令可丸併手丸  
之如梧子大每服以酒一升進三四十九日一當倒  
腹吐不吐下利更酒漬苦參二斤浸久彌佳非止暴  
痛如骭骨骭等痛凡是腹中之疾悉主之又治宿冷  
血結陰癖頻用有效大良

治卒中惡心痛方

苦參

三兩

右一味㕮咀以好酢一升半煮取八合強者頓服老



小分二服

又方桂心

一兩

右一味咬咀以水四升煮取一升半分作三服

治蟲心痛方

鶴蝨為末蜜和丸如梧子大服四十丸蜜湯下日一服可加至五十丸慎酒肉

又方鶴蝨一兩為末以溫酢一盞和空腹服之蟲當吐  
出之

又方服漆一合方見養性服餌篇中凡蟲心痛皆用漆主之

五辛湯治心腹冷痛方

細辛

蜀椒

桂心

乾薑

吳茱萸

芍藥

防風

苦參

甘草

乾地黄

當歸

各一兩

梔子

烏梅

大棗

各二枚

右十四味㕮咀以水九升煮取三升分四服

犀角圓治心腹久痛積年不定不過一時間還發甚則  
數日不能食又便出乾血窮天下方不能瘥甄立言處  
此方數日即愈

犀角

麝香

雄黃

桔梗

莽草

鬼臼

桂心

芫花  
各兩半

甘遂

一兩半

光明砂

附子

各六銖

貝齒

五枚

巴豆

二十枚

赤足蜈蚣

二枚

右十四味為末蜜丸如梧子飲服一丸日二漸加至

三凡以微利為度

古今集驗  
無雄黃

高良薑湯治卒心腹絞痛如刺兩脇支滿煩悶不可忍

方

高良薑

五兩

厚朴

二兩

當歸

桂心

各三兩

右四味㕮咀以水八升煮取一升八合分三服日二  
若一服痛止便停不須更服强者為二服劣者分三  
服

當歸湯治心腹絞痛諸虛冷氣滿痛方

當歸

芍藥

厚朴

半夏

各二兩

桂心

甘草

黃耆

人參

各三兩

乾薑

四兩

蜀椒

一兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升二合分四服羸劣

人分六服

小品方云大冷加附子一枚良

又方治虛冷腹痛不下飲食食復不消膨脹者方

當歸

茯苓

各五分

黃耆

紫苑

各四分

高良薑

乾薑

各六分

鹿茸

桂心

昆布

肉蓯蓉

橘皮

各三分

甘草

兩二

烏頭

兩一

大棗

四十枚

桃仁

一百枚

地骨皮

法麴

大麥蘖

各一升

右十八味㕮咀以水一斗五升煮取四升二合分為

五服下利加赤石脂龍骨各三分渴加麥門冬一升

又方治寒冷腹中痛方

小品名吳茱萸湯

當歸

兩二

桂心

甘草

人參

各一兩

生薑

兩五

半夏

小麥

各一升

吳茱萸

二升

右八味呖咀以水一斗五升煮取三升分三服日三  
亦治產後虛冷

又方治冷氣脇下往來衝胸膈痛引脇背悶者方

當歸

桂心

人參

甘草

吳茱萸

芍藥

大黃

茯苓

枳實

各一兩

乾薑

三兩

右十味呖咀以水八升煮取二升半分三服日三治

尸疰亦佳

外臺仲景方  
無茯苓枳實

又方治久寒疾胸腹中痛時下利方

當歸

兩三

甘草

橘皮

兩各二

附子

兩一

乾薑

兩四

右五味㕮咀以水八升煮取二升分三服日三

又方治久寒宿疾胸腹中痛短氣時滯下利方

當歸

桂心

兩各三

乾薑

兩四

附子

兩一

右四味㕮咀以水八升煮取二升分三服日三

范汪  
無附

子用甘草二兩云虛冷激痛  
甚者加黃耆芍藥各二兩



溫中當歸湯治心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止多熱喜涎出是蛇蟲咬也服二三劑後若不效有異宜改方增損之

當歸

人參

乾薑

茯苓

厚朴

木香

桂心

桔梗

芍藥

甘草

各二兩

右十味㕮咀以水八升煮取三升分溫五服日三不耐木香者以犀角一兩代之

羊肉當歸湯治腹冷絞痛方

卷四十一

羊肉

半斤

當歸

四分

乾薑

橘皮

黃耆

芍藥

芎藭

桂心

獨活

防風

各三分

吳茱萸

人參

甘草

乾地黄

茯苓

各一分

生薑

六分

大棗

三十枚

右十七味㕮咀以水一斗半先煮肉取一斗二升出肉次內諸藥煮取三升分三服日三覆取溫煖

溫脾湯治腹痛臍下絞結繞臍不止方

甘草

附子

人參

芒硝

各二兩

當歸

乾薑

各三兩

大黃

五兩

右七味㕮咀以水七升煮取三升分服日三

生薑湯治胃腹中卒痛方

生薑

一斤  
取汁

食蜜

八兩

醍醐

四兩

右三味微火上耗令相得適寒溫服三合日三

熨蒸法凡心腹冷痛者

熬鹽一斗熨熬蠶沙燒磚石蒸熨取其裏溫煖止蒸  
土亦大佳

針灸法

凡邪在心則心痛善悲時眩仆視有餘不足而調其  
輸

腎心痛先取京骨崑崙發針不已取然谷

胃心痛取大都太白

脾心痛取然谷太谿

肝心痛取行間太衝

肺心痛取魚際太淵

心痛引腰脊欲嘔刺足少陰

心痛引背不得息刺足少陰不已取手少陰

心痛腹脹瀯瀯然大便秘不利取足太陰

心痛小腹滿上下無常處漉便難刺足厥陰

心痛短氣不足以息刺手太陰

心痛不可按煩心巨闕主之

心痛有三蟲多涎不得反側上管主之

心痛身寒難以俯仰心疝衝胃死不知人中管主之

心痛如針錐刺然谷及太谿主之

心腹中卒痛石門主之

心疝暴痛取足太陰

心懊懺微痛煩逆灸心輸百壯

心痛如錐刀刺氣結灸膈輸七壯

心痛冷氣上灸龍領百壯在鳩尾頭上行一寸半不可

刺之

心痛惡氣上脇急痛灸通谷五十壯在乳下二寸

心痛暴絞急絕欲死灸神府百壯在鳩尾正心有忌

心痛暴惡風灸巨闕百壯

心痛堅煩氣結灸太倉百壯

心痛灸臂腕橫文三七壯又灸兩虎口白肉際七壯

胃痺第七

論方  
灸法

論曰胃痺之病令人心中心堅滿痞急痛肌中苦痺絞急

如刺不得俯仰其胸前皮皆痛手不得犯胸中幅幅而滿短氣欬唾引痛咽塞不利習習如癢喉中乾燥時欲嘔吐煩悶白汗出或徹引背痛不治之數日殺人

論曰夫脉當取太過與不及陽微陰弦即胸痺而痛所以然者責甚極虛故也今陽虛知在上焦所以胸痺心痛者以其人脉陰弦故也平人無寒熱短氣不足以息者實也

枳實薤白桂枝湯治胸痺心中痞氣結在胸胸滿脇下



逆搶心方

枳實

四枚

薤白

一斤

桂枝

兩

厚朴

三兩

栝蒌實

一枚

右五味㕮咀以水七升煮取二升半分再服

仲景方厚朴用

四兩薤白半斤水五升煮取二升半服之

栝蒌湯治胸痺病喘息欬唾胸背痛短氣寸脉沈而遲

關上小緊數方

栝蒌實

一枚

半夏

半升

薤白

一斤

枳實

二兩

生薑

四兩

右五味㕮咀以白朮漿一斗煮取四升服一升日三

仲景肘後不用  
生薑枳實半夏

治胃痺候胃中幅幅如滿噎塞習習如癢喉中澀燥唾

沫宜此方

橘皮

一斤

生薑

半斤

枳實

五枚

右三味㕮咀以水五升煮取二升去滓分再服

治中湯胃痺方

茯苓湯治胸中氣塞短氣方

茯苓

兩三

甘草

兩一

杏仁

枚三十

右三味㕮咀以水一斗三升煮取六升去滓為六服

日三未瘥再合服

通氣湯治胃滿短氣噎塞方

半夏

兩八

生薑

兩六

橘皮

兩三

吳茱萸

枚四十

右四味㕮咀以水八升煮取三升分三服

一方用桂二兩無橘

皮

細辛散治胃痺達背短氣方

細辛

甘草

各二兩

枳實

生薑

桔萐實

乾地黄

白朮

各三兩

桂心

茯苓

各五兩

右九味治下節酒服方寸匕日三

蜀椒散治胃痺達背方

蜀椒

食茱萸

各一兩

桂心

桔梗

各三兩

烏頭

半兩

豉

六銖

右六味治下篩食後酒服方寸七日三

前胡湯治胃中逆氣心痛徹背少氣不食方

前胡

甘草

半夏

芍藥  
各二兩

黃芩

當歸

人參

桂心  
各一兩

生薑

三兩

大棗

三十枚

竹葉

一升

右十一味㕮咀以水九升煮取三升分為四服

又方

前胡

人參

生薑

半夏

麥門冬

甘草

芍藥

茯苓

錫

各三兩

桂心

黃芩

當歸

各一兩

大棗

三十枚

右十三味咬咀以水一斗四升煮取三升去滓分三

服

熨背散治胸背疼痛而悶方

烏頭

細辛

附子

羌活

蜀椒

桂心

各五兩

芫花

一兩六銖

右七味治下節帛裹微火炙令煖以熨背上取瘡乃止慎生冷如常法

下氣湯治胸腹背閉滿上氣喘息方

杏仁

四七枚

大腹櫝榔

二七枚

右二味㕮咀以童子小便三升煎取一升半分再服曾患氣發輒合服之

櫝榔湯主破胸背惡氣音聲塞閉方

櫝榔

極大者四枚小者八枚

右一味二品呋咀以小兒尿二升半煮減一升去滓  
分三服頻與五劑永定

灸法

胸痺引背時寒間使主之

胸痺心痛天井主之

胸痺心痛不得息痛無常處臨泣主之

胸痺心痛灸臍中百壯穴在鳩尾上一寸忌針

胸脇滿心痛灸期門隨年壯穴在第二肋端乳直下一



寸半

備急千金要方卷四十一

欽定四庫全書

備急千金要方卷四十二

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

心臟方

頭面風第八方 拔白髮

芎藭酒治腦風頭重頸頭強眼眵眵淚出善欠目欲眠  
睡憎風劇者耳鳴滿眉眼疼悶吐逆眩倒不自禁諸風  
乘虛經五臟六腑皆為癰狂諸邪病悉主之方

芎藭

辛夷

天雄

人參

天門冬

栢子仁

磁石

石膏

茵芋

山茱萸

白頭翁

桂心

秦朮

各三兩

松蘿

羚羊角

細辛

薯蕷

菖蒲

甘草

各二兩

雲母

一兩燒令赤末為粉

防風

四兩

右二十一味㕮咀以酒二斗漬七日初服二合漸加至五合日三有女人少時患風眩發則倒地為婦積

年無兒服此酒并將紫石門冬丸服之眩瘥生兒平

復

紫石門冬丸方  
出婦人方中

治頭眩屋轉眼不得開方

翼名人  
參湯

人參

當歸

防風

黃耆

麥門冬

芍藥

各二兩

獨活

白朮

桂心

各三兩

右九味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

防風湯治風眩嘔逆水漿不下食輒嘔起即眩倒發有

時手足厥冷方

防風

防己

附子

乾薑

甘草

各一兩

蜀椒

桂心

各二兩

右七味㕮咀以水四升煮取二升分三服日三

古今錄驗

用白朮一兩

又方治頭風眩欲倒眼旋屋轉腦痛方

防風

枳實

杏仁

芎藭

各三兩

茯苓

麻黃

前胡

生薑

半夏各四兩

細辛二兩

竹瀝三升

右十一味㕮咀以水六升合竹瀝煎取二升七合分  
三服頻服三兩劑佳

茵芋湯治風虛眩眼暗方

茵芋一分

人參

甘草

菴蓉

黃耆

茯苓

秦朮

厚朴

烏喙

各二兩

防風

六兩

山茱萸

松實

各三兩

右十二味㕮咀以水一斗煮取二升半分五服強者

一日夜盡羸者分五服二日盡

鴟頭酒治風頭眩轉面上遊風方

飛鴟頭

五枚

茯神

一方無

防風

芎藭

薯蕷

各四兩

葛根

桂心

細辛

人參

天雄

乾薑

枳實

貫衆

蜀椒

各三兩

獨活

二兩

山茱萸

一升

麥門冬

一作天門冬

石南

一作石膏各五兩

右十八味㕮咀絹囊盛清酒四斗漬六宿初服二合



日再服稍加以知為度

大三五七散治頭風眩口喎目斜耳聾方

天雄

細辛

各三兩

山茱萸

乾薑

各五兩

薯蕷

防風

各七兩

右六味治下篩清酒服五分七日再不知稍加

千金翼云

亦治面  
骨痛疼

小三五七散治頭風目眩耳聾方

天雄

三兩

薯蕷

七兩

山茱萸

五兩

右三味治下篩以清酒服五分七日再不知稍增以  
知為度

茯神湯治風眩倒屋轉吐逆惡聞人聲方

茯神

獨活

雨各四

黃耆

遠志

防風

雨各五

生薑

雨三

甘草

人參

當歸

牡蠣

白朮

菴蓉

附子

雨各二

右十三味㕮咀以勞水一斗二升煮取三升服五合

一日夜盡

防風散治頭面風在眉間得熱如蟲行或頭眩目中淚

出方

防風

兩五

桂心

天雄

細辛

朱砂

乾薑

人參

烏頭

附子

兩各二

莽草

茯苓

當歸

兩各一

右十二味治下篩酒服方寸七日三

又方治風頭眩惡風吐冷水心悶方

防風

二兩

澤瀉

一作澤蘭

天雄

翼作人參

細辛

附子

薯蕷

茯苓

各一兩

白朮

二兩半

桂心

一兩半

乾薑

半兩

右十味治下節酒服方寸匕常令酒氣相接則脫巾

帽解髮梳頭百過復投一升酒便洗手足須臾自熱

解髮以粉粉之快然便熟眠愈亦可洗頭面汁出

翼云

如服寒食散法

治風眩翻倒無定方

獨活

六兩

石膏

蒟蒻

各四兩

枳實

三兩一方  
用枳實

右四味㕮咀以清酒八升煮取四升頓服之以藥滓  
熨頭覆眠取汗覺冷又內鎗中炒令熱熨之

治患頭眩暈經久得瘥後四體漸羸食無味好食黃土  
方

麴

二斤

白朮

三斤

右二味為末酒和併手丸如梧桐子曝乾飲服三十

九日三斷食土為效

治頭中五十種病方

巴戟

菊花

芎藭

乾薑

栝蒌根

防風

石南

白朮

烏頭

山茱萸

附子

細辛

薯蕷

蜀椒

乾地黄

人參

桔梗

秦朮

澤瀉

甘草

天雄

羌活  
各等分

右二十二味治下節以酒服方寸七日三

摩頭散治同前

藺茹

半夏

蜀椒

各六分

烏頭

八分

桂心

七分

莽草

四分

附子

細辛

各一兩

右八味治下節以大酢和摩頭記日數三日頭膚痛  
四五日後一著藥如前十日以酢漿洗頭復摩藥即  
愈若生息肉并喉咽中息肉大如棗欲塞以藥摩之  
即愈耳鼻齒有疾並用之良

入頂散治頭面脹滿腦癭偏枯發作有時狀似刀刺失聲陰陰然疼面目變青方

山茱萸

芎藭

防風

獨活

各一兩半

細辛

莽草

白朮

薯蕷

牛膝

石南

甘草

各一兩

烏頭

通草

菖蒲

附子

麻黃

天雄

蜀椒

桔梗

各一兩六銖

右十九味治下節酒服方寸匕日三



杏仁膏治上氣頭面風頭痛胸中氣滿賁肭氣上下往來心下煩熱產婦金瘡百病方

杏仁

一升去皮尖雙仁者不在用

右一味搗研以水一斗漉取汁令盡以銅器塘火上從旦煮至日入當熟如脂膏下之空腹酒服一方寸匕日三不飲酒者以飲服之慎猪魚蒜酢

大豆酒治頭風方

大豆

三升炒令無聲

右一味先以一斗二升瓶盛清酒九升乘豆熱即傾  
著酒中密泥頭七日溫服之

治中風頭痛發熱耳頰急方

麻黃

葛根

石膏

桂心

兩各三

附子

芍藥

甘草

秦朮

防風

兩各二

生薑

兩五

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服覆取汗

薯蕷散治頭目有風牽引目睛疼痛偏視不明方

薯蕷

三兩

細辛

一兩半

秦朮

天雄  
各二兩

獨活

桂心

山茱萸

各二兩半

右七味治下篩酒服方寸匕日三

治頭中痛身熱風熱方

竹瀝

三升

升麻

生薑

杏仁

各三兩

芍藥

柴胡

各闕兩

石膏

生葛根

各八兩

右八味以水六升合竹瀝煮取二升七合分三

服

菊花散治頭面遊風方

菊花

一兩

細辛

附子

桂心

乾薑

巴戟

人參

石南

天雄

茯苓

秦艽

防己

各二兩

防風

白朮

山茱萸

薯蕷

各三兩

蜀椒

五合

右十七味治下篩酒服方寸匕日三

治頭面上風方

松脂

石鹽

杏仁

蜜蠟  
各一兩

薰陸香

二兩

蓖麻仁

三兩

右六味熟搗作餅淨剝百會上髮貼膏膏上安紙三日一易若癢刺藥上不久風定

頭風散方

附子

一枚中  
形者 鹽 如附  
子大

右二味治下篩沐頭竟以方寸匕摩頂上日三

治頭風方

服荊瀝不限多少取瘥止

又方搗蒴藿根一升酒二升漬服汗出止

又方蔓荊子一升為末絹袋盛以酒一斗浸七宿溫服

三合日三

又方臘月烏雞屎一升炒令黃為末絹袋盛以酒三升  
浸溫服任性常令醺酣

又方七月七日麻勃三斗麻子一石末相和蒸之沸湯  
一石五斗三遍淋之煮取一石漬神麴二十斤令發釀

黍米兩石五斗熟封三七日服清一升百日身中濕度  
八風胸膈五臟骨髓伏風百病悉去

治卒中惡風頭痛方

擣生烏頭以大酢和塗故布上薄痛處須臾痛止日  
夜五六薄逐痛處薄之擣烏頭須去皮

又方鹽一升為末以麻油二升煎一宿令消盡塗頭石  
鹽尤良

又方芥子為末酢和傅頭一周時

沐頭湯治肺勞熱不問冬夏老少頭生白屑搔癢不堪  
然肺為五臟之蓋其勞損傷肺氣衝頭頂致使頭癢多  
生白屑搔之隨手起人多患此皆從肺來世呼為頭風  
也方

大麻子

秦椒

各三升

皂莢屑

五合肘後無

右三味熟研內泔中一宿漬去滓水七攪百遍取勞  
乃用沐頭髮際更別作皂莢湯濯之然後傳膏

又方



菊花

獨活

茵芋

防風

細辛

蜀椒

皂莢

杜蘅

莽草

桂心

右十味各等分可作湯沐及熨之

又方

猪椒根

三兩

麻黃根

防風

各二兩

細辛

茵芋

各一兩

右五味㕮咀以水三斗煮取一斗去滓溫以沐頭

又方葶藶子煮湯以沐不過三四度愈

又方蜀椒二升以水煮取汁沐髮良

又方以桑灰汁沐頭去白屑神良

治頭項強不得顧視方

蒸好大豆一斗令變色內囊中枕之

又方常以九月九日取菊花作枕袋枕卧良

又方八月後取荊芥鋪床又作枕枕頭立春日去之

又方穿地作小坑燒令赤以水沃之令小冷內生桃葉

滿其上布席就卧令項當藥上以衣著項兩邊令氣蒸病上汗出良久愈若病大者作地坑亦大

犀角湯治風毒熱頭面腫方

犀角

生薑

各二兩

苦參

桔萋根

防風

各一兩

石膏

六兩

黃芩

青木香

升麻

各三兩

防己

一兩半

竹葉

二握

右十一味㕮咀以水七升煮取二升分三服相去十里久內消不利

防風散治頭面徧身風腫方

防風

二兩

白芷

一兩

白朮

三兩

右三味治下篩酒服方寸匕日三

治卒中風頭面腫方

搗杏仁如膏以雞子黃合搗令相得傳帛上厚裹之  
自乾不過八九傳瘥

令白髮還黑方

烏麻丸蒸九曝為末以棗膏丸之久服之

又方

旋復花升一

秦椒升一

桂心尺一

隴西白芷升一

右四味治下篩以井花水服方寸七日三服三十日

白髮還黑禁房室

石灰酒治頭髮落不止方

石灰三升細篩水拌令濕極熟蒸之炒令至焦以木  
札投中火即著為候停冷取三升絹袋貯之以酒三  
斗漬三宿初服半合日三四夜二稍加至一合神驗

沐頭湯治脉極虛寒鬚髮墮落令髮潤澤方

桑根白皮切三升以水五升淹漬煮五六沸去滓洗  
沐髮數數為之自不復落

又方

麻子

三升  
碎

白桐葉

切一  
把

右二味以米泔汁二斗煮五六沸去滓以洗沐則髮  
不落而長甚有驗

治鬚髮墮落令生長方

生栢葉

切一升

猪膏

三升

附子

四枚

右三味為末以膏和為三十九丸用布裹一丸內泔汁中煎沐髮長不落其藥密收貯勿令洩氣

又方

麻葉

桑葉

右二味以泔煮去滓沐髮七遍長六尺

又方羊糞灰淋汁洗之日三一洗不過十洗大生

又方

附子

蔓荊子

栢子仁

各三分

右三味以烏雞膏和擣三千杵貯新瓷器中封百日  
出以馬髻膏和以傅頭訖巾裹之勿令見風日三傅

即生

肘後不用栢子  
仁以酒漬澤沐

摩膏治頭中二十種病頭眩髮禿落面中風者方

蜀椒

莽草

各二兩

桂心

蘭茹

附子

細辛

各一兩半

半夏

乾薑

各一兩

右八味㕮咀以生豬肪二十兩合擣令肪消盡藥成



先沐頭令淨然後以藥摩顙上日一即愈如非十二  
月合則用生烏麻油和塗頭皮沐頭令淨乃用之一

頓生髮如昔

必效方無蜀椒  
莽草半夏乾薑

生髮膏治頭中風癢白屑方

蔓荊子

附子

細辛

續斷

零陵香

皂莢

澤蘭

防風

杏仁

藿香

白芷

各二兩

松葉

石南

各三兩

莽草

一兩

馬鬣膏

猪脂

松膏

各二升

熊脂

三升

右十八味㕮咀以清酒醋三升漬藥一宿明旦以馬  
鬻膏等微火煎三上三下以白芷色黃膏成用以澤  
髮

又方

烏喙

三兩

莽草

石南

細辛

續斷

皂莢

澤蘭

白朮

辛夷

防風

白芷

各二兩

竹葉

松葉

栢葉

各半升

猪脂

四升

右十五味㕮咀以清酢三升漬一宿明旦微火以脂煎三上三下白芷色黃膏成去滓瀝取於沐髮後塗之一方用生油三大升

千金翼無石南用杏仁不用白芷灰汁洗頭去白屑神良

又方

甘松香

丁香

白芷

澤蘭

桑白皮

桑寄生

大麻

苜蓿

杏仁

牡荊子

辛夷仁

芎藭

防風

莽草各一兩

零陵香

吳藿香

細辛

蜀椒各二兩

竹葉

松葉

栢葉

各半升

胡麻油

臘豬膏各一升

烏雞肪

雁肪

各一合

右二十五味，以酢漬一宿，內油膏中，微火煎，三上三下，白芷色黃，膏成，去滓，塗頭上，日二夜，一髮生。

又方治髮鬢禿落方

莽草

一兩

防風

升麻

白芷

薺花

各二兩

蜣螂

四枚

驢鬚膏

豹膏

一作狗膏

馬鬚膏

熊膏

一作雄雞膏

猪膏

各半升

右十一味其六味㕮咀與諸膏合煎諸藥沸則下停冷復上火三五沸止絞去滓傳頭當澤用之

又方治眉落髮落生髮方

白芷

附子

防風

芎藭

莽草

辛夷

細辛

黃芩

當歸

蜀椒

各一兩

大黃

一兩半

蔓荊子

一升

馬髻膏五合 猪膏三升

九月二十五日一作十五日 十月十日

十一月十日 十二月十日

右並以日正午拔之當日不飲酒食肉五辛經一拔  
黑者更不變

又方取除日自拔白以鼈脂塗之又猪狗膽塗之又狗  
乳亦塗之

又方用白蜜傅髮孔即不復生也

治染鬚髮方

胡粉

三兩

石灰

六兩  
絹篩  
燬令黃

右二味如粉以榆皮作湯和之如粉先以皂莢湯洗髮令極淨不得令有膩氣好曝乾夜卧以藥塗髮上令勻訖取桑葉相綴著頭巾上徧以裹髮一夜至旦取醋漿熱煖三遍淨洗髮又以醋泔熱煖洗髮又取生胡麻苗擣取汁三升和水煮一二沸淨濾以濯髮訖又用油湯濯之百日黑如漆

又方以鹽湯洗沐後以生麻油和蒲葦灰傅之

一作治白禿

又方黑椹水漬之塗髮令黑

又方生麻油漬烏梅常用傅頭乃良

治髮黃方

臘月猪脂和羊屎灰蒲灰等分封頭三日一為之

又方大豆五升酢漿水二斗煮取五升沐之

治鬢髮黃赤方

燒梧桐灰用乳汁和塗傅鬢髮并皮肉鬢髮即黑



治風頭毛髮落不生方

鐵上生衣研以臘月豬脂和塗之日三亦治眉毛落  
生眉毛方

鐵生衣

牆上青衣

右二味等分為末以水和塗之即生

又方七月烏麻花陰乾為末以生烏麻油漬之二日一  
塗

治眉毛鬢髮火燒瘡瘕毛不生方

蒲灰以正月狗腦和傅即生

治髮落不生令長方

麻子一升熬黑壓取油以傅頭長髮妙

又方用雁肪傅之

又方多取烏麻花瓷器盛密蓋深埋之百日出用塗髮  
令髮易長而黑

治禿頭方

蕪青子為末以酢和傅之日三

又方東行棗根長三尺以中央安甑中心蒸之以器盛

兩頭汁用塗頭髮即生

肘後作桑根良

又方麻子三升熬焦為末以豬脂和塗之髮生為度

拔白髮良日

正月四日

二月八日

三月十二日

四月十六日

五月二十日

六月二十四日

七月二十八日

八月十九日

剪爪甲搔令毛孔少血出以蜜塗之即生黑毛

治禿無髮者方

黑熟椹二升內甕中日中曝三七日化為水洗瘡上  
三七日髮生神效

松瀝煎治頭瘡及白禿方

松瀝

七合

丹砂

雄黃

水銀

研各二兩

黃連

三兩

礬石

一兩一云峭粉

右六味治下篩內瀝中攪研令調以塗之先以泔清  
洗髮及瘡令無痂然後傳藥二日一傳三傳後當更

作膿膿訖更洗凡經三度膿出訖以甘草湯洗去藥毒前後洗十數度即瘥

治白禿髮落生白痂終年不瘥方

五味子

蛇床子

遠志

各三分

兔絲子

五分

菰蓉

松脂

各二分

雄黃

白蜜

各一分

雞屎白

半分

雌黃

一分

右十味治下篩以猪膏一升二合先內雄黃次內雌黃次內雞屎白尿次內蜜及松脂又次內諸藥煎之膏

成先以桑灰洗頭燥傳之

王不留行湯治白禿及頭白久瘡去蟲止痛之方

王不留行 東引茱萸根皮

桃東南枝

各五兩

蛇牀子

牡荊子

苦竹葉

蒺藜子

各三升

大麻仁升

右八味㕮咀以水二斗半煮取一斗洗瘡日再并療

癰疽妬乳月蝕瘡爛

松脂膏治白禿及癰疽百瘡方

松脂

六兩

礬石

杜蘅

一作杜荊

雄黃

附子

大黃

石南

秦朮

真珠

苦參

水銀

木蘭

各一兩

右十二味㕮咀以酢漬一宿猪膏一斤半煎之以附子色黃去滓乃內礬石雄黃水銀更著火三沸安濕地待凝以傳上日三

治白禿方

羊肉濕脯炙令香及熱速搭上不過三四度癢勿搔

之牛肉亦得

又方新破猪肚去糞及熱速搭上癢慎勿搔當縛兩手

日中卧半日去之

又方皂莢湯淨洗乾拭然後以陳久油滓塗之日三

又方煮桃皮汁飲之并洗

又方麴豆豉兩種治下節醋和薄上

麴一作麴

又方大黑豆炒令焦為末和臘月猪脂熱暖時以匙抄

封上徧即裹著勿見風



又方桃花為末和豬脂封上

必效方以桑椹末同和傳之良

治赤禿方

桑灰汁洗頭令淨擣桑椹封之日中曝頭睡

又方馬蹄灰為末以臘月豬脂和傳之

又方燒牛角灰和豬脂傳之

又方擣黑椹取三升服日三

令髮不生方

蚌灰鼈脂相和新拔毛即塗毛孔上永不生也

治鬼舐頭方

燒猫兒尿以臘月猪脂和傳上

又方猫兒毛燒灰以膏和傳之

又方塼末和蒜搗傳日一度

增損當歸湯治心腹蘊蘊然痛方

當歸

升麻

各三兩

芍藥

黃芩


朴硝

桔梗

柴胡

各四兩

右七味咬咀以水八升煮取二升半分三服



欽定四庫全書

備急千金要方  
卷四十二

備急千金要方卷四十二

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷四十三

四

詳校官太醫院醫士<sub>臣</sub>舒岱

編修<sub>臣</sub>倉聖脈覆勘

總校官中書<sub>臣</sub>朱 鈐

校對官中書<sub>臣</sub>范 鏊

膳錄監生<sub>臣</sub>張若湘

欽定四庫全書

備急千金要方卷四十三

唐孫思邈撰

宋林億等校正

小腸腑方

小腸腑脉論第一

論曰小腸腑者主心也舌是其候也心合於小腸小腸者受盛之腑也號監倉吏重二斤十四兩長二丈四尺廣二寸四分

難經甲乙云長三丈二尺大後附脊左回二寸半徑八分分之少半也

疊積其注於回腸者外傳臍上回運環反十六曲常留

水穀二斗四升其一斗二升是水一斗二升是穀應主

二十四氣也

難經云十六曲盛穀二斗四升水六升三合合之大半甲乙云受三斗三合合之大

半脣厚人中長以候小腸小腸病者小腹痛腰脊控羣

而痛時窵之復耳前熱若寒甚獨肩上熱及手小指次

指之間熱若脉滑者

脉經作陷甲乙亦同

此其候也

小腹控羣引腰脊上衝心邪在小腸者連羣系屬於脊

貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃動肝肺散於育

結於臍故取之育原以散之刺太陰以與之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之

左手關前寸口陽絕者無小腸脉也苦臍痺小腹中有疝瘕王月即冷上搶心刺手心主治陰心主在掌後橫文中入一分

左手關前寸口陽實者小腸實也苦心下急熱痺小腸內熱小便赤黃刺手太陽治陽手太陽在手小指外側本節陷中



小腸有寒其心下重便膿血有熱必痔

小腸有宿食常暮發熱明日復止

小腸脹者小腹膜脹引腹痛

心前受病移於小腸心欬不已則氣與欬俱出

厥氣客於小腸夢聚邑街衢

心應皮皮厚者脉厚脉厚者小腸厚皮薄者脉薄脉薄

者小腸薄皮緩者脉緩脉緩者小腸大而長皮薄而脉

沖小者小腸小而短諸陽經脉皆多紆屈者小腸結

扁鵲云手少陰與太陽為表裏所以表清裏濁清實濁虛故食下腸實而胃虛故腑實而不滿實則傷熱熱則口張口為之生瘡虛則傷寒寒則便泄膿血或發裏水其根在小腸先從腹起方見治水篇中

小腸絕不治六日死何以知之髮直如乾麻不得屈伸白汗不止

手太陽之脉是動則嗌痛頷腫不可以顧肩似拔臑似折是主液所生病者耳聾目黃頰頷腫頸肩臑肘臂外

後廉痛

經脉支別已見心臟部中

小腸虛實第二

脉方灸法

小腸實熱

左手寸口人迎以前脉陽實者手太陽經也病苦身熱來去汗不出心中煩滿身重口中生瘡名曰小腸實熱也

柴胡澤瀉湯治小腸熱脹口瘡方

柴胡

澤瀉

橘皮

一用桔梗

黃芩

旋復花

枳實

升麻

芒硝

各三兩

生地黃

切一升

右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓下芒硝分三服

大黃圓治小腸熱結滿不通方

大黃

芍藥

葶藶

各二兩

大戟

朴硝

各三兩

杏仁

五十枚

巴豆

七枚

右七味為末蜜和丸如梧子大飲服大人七丸小兒

二三九日二熱去日一服

灸法

小腸熱滿灸陰都隨年壯穴俠中管兩邊相去一寸是也

小腸泄痢膿血灸魂舍一百壯小兒減之穴在俠臍兩邊相去各一寸

翼云相去一寸

又灸小腸輸七壯

小腸虛寒

左手寸口人迎以前脉陽虛者手太陽經也病苦顙際

偏頭痛耳頰痛名曰小腸虛寒也

治小腸虛寒痛下赤白腸滑腸中懊懷補之方

乾薑

三兩

當歸

黃蘗

地榆

各四兩

黃連

阿膠

各二兩

石榴皮

三枚

右七味㕮咀以水七升煮取二升五合去滓下膠煮取膠烱盡分三服

### 舌論第三

論曰凡舌者心主小腸之候也舌重十兩長七寸廣二

寸半善用機衡能調五味也凡有所啖若多食鹹則舌  
脉凝而變色多食苦則舌皮槁而外毛焦枯多食辛則  
舌筋急而爪枯乾多食酸則舌肉肥而脣揭多食甘則  
舌根痛而外髮落又曰心欲苦肺欲辛肝欲酸脾欲甘  
腎欲鹹此五味內合五臟之氣也若臟熱則舌生瘡引  
脣揭赤若腑寒則舌本縮口噤脣青寒宜補之熱宜瀉  
之不寒不熱依臟腑調之舌縮口噤脣青升麻煎主之  
方見別卷

風眩第四

叙論  
灸禁法

方

前卷既有頭面風方風眩不當分出思邈蓋以此是  
徐嗣伯方不可以餘方相雜故此特立風眩方條專  
出徐氏方焉

徐嗣伯曰余少承家業頗習經方名醫要治備聞之矣  
自謂風眩多途諸家未能必驗至於此術鄙意偏所究  
也少來用之百無遺策今年將衰暮恐奄忽不追故顯  
明證論以貽於後云爾



夫風眩之病起於心氣不定胃上蓄實故有高風面熱之所為也痰熱相感而動風風心相亂則悶瞀故謂之風眩大人曰癰小兒則為癰其實則一此方療治萬無不愈但恐證候不審或至差違大都忌食十二屬肉而責脈為患發多氣急氣急則死不可救故此一湯是輕重之宜勿因此便謂非患所治風眩湯散丸煎凡有十方凡人初發宜急與續命湯也困急時但度灸穴便火針針之無不瘥者初得針竟便灸最良灸法次列於後

余業之以來三十餘年所救活者數十百人無不瘥矣  
後人能曉此方幸勿參以餘術焉

續命湯治風眩發則煩悶無知口沫出四體角弓目反  
上口噤不得言方

竹瀝

一升  
二合

生地黄汁

一升  
四兩

生薑

防風

麻黃

各四  
兩

防己

三兩

附子

三分

石膏

七兩

桂心

二兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服有氣加附

子作一兩紫蘇子五合橘皮半兩已服續命湯口開  
四肢尚未好定而心中尚不除者紫石湯主之方見  
後紫石煮散是也

責豚湯治氣奔急欲絕方

吳茱萸

升一

石膏

人參

半夏

芍藥

各三分

桂心

芍藥

生薑

各四分

生葛根

茯苓

各十分

當歸

四兩

李根皮

一斤

右十二味㕮咀以水七升清酒八升煮取三升分三

服

防已地黃湯治言語狂錯眼目霍霍或言見鬼精神昏亂方

防已

甘草

各二兩

桂心

防風

各三兩

生地黃

五斤別切勿合藥漬疾小輕用二斤

右五味㕮咀以水一升漬一宿絞汁著一面取滓著竹簣上以地黃著藥滓上於五斗米下蒸之以銅器盛取汁飯熟以向前藥汁合絞取之分再服

薯蕷湯治心中驚悸而四肢緩頭面熱心胸痰滿頭目眩胃如欲搖動方

薯蕷

麥門冬

人參

各四兩

生地黃

前胡

芍藥

各八分

枳實

遠志

生薑

各三分

茯苓

茯神

各六分

半夏

五分

甘草

黃芩

竹葉

各二分

秫米

三合

右十六味㕮咀取江水高舉手揚三百九十下量取三斗煮米減一斗內半夏復減九升去滓下藥煮取

四升分四服無江水處以千里東流水代之校手令  
上頭也秦中無江水涇渭水可用諸葛灌劔由尚取  
之

防風湯服前湯後四體尚不涼冷頭目眩轉者服之此  
湯大勝宜長將服但藥中小小消息隨冷煖耳仍不除  
瘥者依此方

防風

石膏

人參

赤石脂

白石脂

生薑

龍骨

寒水石

茯苓

分各三

桂心

分二

紫石

分一

右十一味㕮咀以水八升煮取三升分三服凡用井花水者取清淨也今用江水無泥又無砂穢源泉遠涉順勢歸海不逆上流用以治頭必歸於下故也

薯蕷煎方

薯蕷

分二十

甘草

分十四

澤瀉

人參

黃芩

分各四

當歸

白欬

桂心

防風

分各三

麥門冬

分三

山茱萸

桔梗

芍藥

紫苑

大豆黃卷

乾地黃

白朮

芍藥

乾薑

蜀椒

各二分已上二  
十味並用擣篩

生地黄

十八斤搗絞取  
汁煎令餘半

麋鹿雜髓

鹿角膠

各八兩

大棗

八十枚

麻子仁

研

蜜

各三升

桑根皮

五升忌岡上自出土者大毒大忌近  
籬屋垣墻下溝瀆邊者皆不中用也

右二十七味以清酒二斗四升煮桑白皮麻子棗得

一斗去滓次下地黄汁膠髓蜜煎減半內前諸未併



煎令可丸如雞子黃大飲服一枚日三稍加至三丸  
薯蕷圓治頭目眩冒心中煩鬱驚悸狂癲方

薯蕷

二十分

甘草

二十分

鹿角膠

大豆黃卷

桂心

七分

乾地黄

神麴

當歸

人參

十分

麥門冬

防風

黃芩

芍藥

白朮

各六分

柴胡

桔梗

茯苓

杏仁

芎藭

各五分

白欬

乾薑

各三分

大棗

一百枚  
取膏

右二十二味為末合白蜜棗膏丸如彈丸先食服一

丸日三

天雄散治頭目眩暈屋轉旋倒方

天雄

防風

芍藥

人參

獨活

桂心

葛根

各三分

莽草

四分

白朮

遠志

薯蕷

茯苓

山茱萸

各六分

右十三味治下節先食以菊花酒服方寸匕日二漸

加至三七以知為度

菊花酒法九月九日取鄧州甘菊花曝乾作末以米饋中蒸作

酒

人參圓治心中時恍惚不定方

上黨人參

鬼臼

鐵精

牛黃

丹砂

雄黃

大黃

菖蒲

防風

各一兩

蜥蜴

赤足蜈蚣

右十一味為末蜜丸如梧子大用前菊花酒服七丸

日三夜一稍加之合藥勿用青紙忌見婦人青衣人

喪孝不具足人及濁穢六畜雞犬鼠等

灸法

其法以繩橫度口至兩邊既得口度之寸數便以其繩一頭更度鼻盡其兩邊兩孔間得鼻度之寸數中屈之取半合於口之全度中屈之先覓頭上迴髮當迴髮灸之以度度四邊左右前後當繩端而灸前以面為正並依年壯多少一年凡三灸皆須瘡瘡又灸壯數如前若連灸火氣引上其數處迴髮者則灸其近當鼻也若迴

髮近額者亦宜灸若指面為癰則闕其面處然病重者亦不得計此也

食禁

虎兔龍蛇牛馬猪羊雞犬猴鼠

右十二相屬肉物皆不得食及以為藥牛黃龍骨齒用不可廢

備急千金要方卷四十三

欽定四庫全書

備急千金要方卷四十四 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

小腸腑方

風癰第五

論方  
針灸法

論曰黃帝問曰人生而病癰疾者安所得之岐伯對曰此得之在腹中時其母數有所大驚也氣上而不下精氣并居故令子發為癰疾病在諸陽脉且寒且熱諸分

且寒且熱名曰狂刺之虛脉視分盡熱病已而止病癲  
初發歲一發不治月一發不治四五日一發名曰癲疾  
刺諸分其脉尤寒者以針補之病已止癲疾始生先不  
樂頭重直視舉目赤其作極已而煩心候之於顏取手  
太陽陽明太陰血變而已癲疾始發而反強因而脊痛  
候之足太陽陽明太陰手太陽血變而已癲疾始作而  
引口啼呼甲乙作喘悸者候之手陽明太陽右强者攻其左  
左强者攻其右血變而止治癲疾者常與之居察其所

當取之處病至視之有過者即寫之置其血於瓠壺之中至其發時血獨動矣不動灸窮骨二十壯窮骨者尾骶也

骨癰疾者頷齒諸輸分肉皆滿而骨倨强直汗出煩悶嘔多涎沫氣下泄不療

筋癰疾者身拳攣急脉大刺項大經之本杼嘔多涎沫氣下泄不療

脉癰疾者暴仆四肢之脉皆脹而從滿脉盡刺之出血



不滿俠項灸太陽又灸帶脉於腰相去三寸諸分肉本  
輸嘔多涎沫氣下泄不療

治癲者病發而狂面皮厚敦敦者死不療

凡癲發則卧地吐涎沫無知若強掠起如狂及遺糞者  
難療

癲疾脉搏大滑久自已脉沉小急實死不療小牢急亦  
不可治脉虛可療實則死矣厥成為癲疾五臟不平六  
腑閉塞之所生也厥成為癲故附厥於此條也陰衰發

熱厥陽衰發寒厥

論曰黃帝問曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥問曰熱厥必起於足下者何也對曰陽氣起於足三趾之表集於足下而聚於足心故陽勝則足下熱也問曰寒厥必起於五趾而上於膝者何也對曰陰氣起於五趾之裏集於膝而聚於膝上故陰氣勝則從五趾至膝上寒其寒也不從外皆從內也厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半

日遠至一日乃知人者何也陰氣盛於上則下虛下虛則腹滿腹滿則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂亂則不知人巨陽之厥腫首頭重足不能行發為眴仆陽明之厥癰疾欲走呼腹滿不得卧面赤而熱妄見而妄言少陽之厥暴聾頰腫而熱脇痛脾不可運太陰之厥腹滿臍脹後不利不欲食食則嘔不得卧少陰之厥舌乾溺赤腹滿心痛厥陰之厥小腹腫痛腹脹溼洩不利好卧屈膝陰縮腫胕内一作外熱盛則瀉之虛則補之不盛

不虛以經取之上寒下熱先刺其項太陽久留之已則  
火熨項與肩甲令熱下冷乃止所謂推而上之者也上  
熱下寒視其虛脉而陷下於經絡者取之氣下而止所謂  
引而下之者也刺熱厥者留針反為寒刺寒厥者留針  
反為熱刺熱厥者二陰一陽刺寒厥者二陽一陰所謂  
二陰者二刺陰也所謂二陽者二刺陽也

論曰溫病熱入腎中亦為瘕小兒病癰熱盛亦為瘕凡  
風瘡暴尸厥及鬼魘不寤皆相似宜精察之故經言久

厥則成癲是以知似也

論曰癲病有五一日陽癲發時如死人遺溺有頃乃解  
二曰陰癲坐初生小時臍瘡未愈數洗浴因此得之三  
曰風癲發時眼目相引牽縱反急強羊鳴食頃方解由  
執作汗出當風因以房室過度醉飲飽滿行事令心氣  
逼迫短氣脉悸得之四曰濕癲眉頭痛身重坐熱沐髮  
濕結腦汗未止得之五曰馬癲發時反目口噤手足相  
引身皆熱坐小時膏氣腦熱不和得之

治五癰方

銅青

雄黃

空青

東門上雞頭

水銀

各一兩

茯苓

猪苓

人參

白芷

白蘞

白薇

石長生

各二兩

卷柏

烏扇

各半兩

硫黃

一兩半

右十五味為末以青牛膽和著銅器中於甑中五斗

大豆上蒸之藥成丸如麻子先食服三十丸日再夜

一

虎睛圓治濕癰掣疵口眼張大口出白沫或作聲或死

不知人方

千金翼名大鎮心丸  
主諸癰所不療者

虎睛

一具酒浸一  
宿而炙之

鬼箭羽

露蜂房二分

獨活

遠志

細辛

貫衆

麝香

白欽一作  
白薇

升麻

白蘚皮三兩

牛黃

防風

秦朮

防葵

龍齒

黃芩

雄黃

山茱萸

乾地黄

一方  
乾薑防已

茯苓

鐵精

鬼臼

人參

大黃

銀屑

各四分

茯神

石膏

天雄

各五分

寒水石

六分

蛇蛻皮

尺一

右三十二味為末蜜和丸如梧子大酒服十五丸日再稍加至二十五丸神方

凡癰發之候其狀多端口邊白沫動無常者治之方

秦朮

人參

防葵

一作防風

茯神

一作牡丹

甘草

各二兩

鈎丹

一兩

貫衆

一枚



右七味咬咀以水九升煮取三升半分三服

雄雌圓治風癲失性顛倒欲死五癲驚癇方

雄黃

雌黃

真珠

各一兩

鈆

二兩  
令成屑

丹砂

二分

水銀

八分

右六味為末以蜜搗三萬杵丸如胡豆大先食服二

丸日二稍加以知為度

古今錄驗云療五癲牛癲則牛鳴馬癲則馬鳴狗癲則狗

鳴羊癲則羊鳴雞癲則雞鳴病五癲狂病者腑臟相引盈氣起寒厥不識人氣爭言方吐沫久而得蘇者

續命風引湯治中風癲眩不知人狂言舌腫出方

麻黃

芎藭

石膏

人參

防風

各三兩

桂心

甘草

獨活

各二兩

防己

附子

當歸

各一兩

杏仁

三十枚

陳薑

五兩一本  
無陳字

右十三味㕮咀以酒三升水一斗合煎取四升分四

服日三夜一

紫石散治大人風引小兒驚癇瘈瘲日數十發醫所不療者方

紫石英

滑石

白石脂

凝水石

赤石脂

石膏

甘草

桂心

牡蠣

各五兩

大黃

龍骨

乾薑

各四兩

右十二味治下節為粗散盛以韋囊懸於高涼處欲

用取三指撮以新汲井水三升煮取一升二合大人

頓服未百日兒服一合未能者綿沾著口中熱多者

日四五服以意消息

深師方只龍骨乾薑牡蠣滑石白石脂五味

治百二十種風癰癩驚狂發即吐沫不識人者四月五

月宜服之方

紫石英

芍藥

龍骨

一本用黃芩

青石脂

白鮮皮

麻黃

當歸

甘草

栝蒌根

桂心

人參

各二兩

牡蠣

三兩

大黃

五兩

右十三味治下篩為粗散分作七裹每以大棗十枚水三升煮取二升半去滓下一裹大棗十中煎取一升去滓頓服相去七日一服服訖即瘥

治癰癩厥時發作方

防葵

代赭

人參

鉛丹

白殭蠶

生豬齒

鈎藤

茯神

雷丸

虎骨

遠志

桂心

防風

各六分

菴栢

葭宕子

光明砂

升麻

附子

牡丹

龍齒

各一分

牛黃

二分

白欬

四分

蚱蟬

十四枚

蛇蛻皮

白馬眼睛

各一具

右二十五味治下篩酒服方寸匕日二亦可為丸良驗

芎藭湯治風癰引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴方

芎藭

藁本

藁茹各五兩

右三味㕮咀內酒一斗煮取三升頓服之羸者分再服取大汗

治風癰方

經心錄名  
鵠頭丸

葶藶子

鈎丹

虎掌

烏頭

桔萸根

各三分

甘遂

天雄

蜀椒

大戟

各二分

白朮

一分

鐵精

蘭茹

各一兩

鵝頭

一枚

右十三味為末蜜丸如梧子湯酒下二九日三服  
又方

地黃

三十斤

天門冬

十斤

右二味搗取汁作煎服之瘥

又方葭苈子三升搗篩酒一斗漬半日絞去滓湯中煎

令可丸先食服如小豆二丸加至如梧子二丸以知為度額上手中從文理中赤起是知也無此候更服病日發者三日愈間日發者十日愈五日發者二十日愈半歲發者一月愈

治癩癰癧癰方

鉛丹

一斤

飛鴟頭

二枚

右二味為末蜜丸先食服三丸日三劇者夜一稍加之



天門冬酒通治五臟六腑大風洞泄虛弱五勞七傷癥結滯氣冷熱諸風癰瘤惡疾耳聾頭風四肢拘攣猥退歷節萬病久服延年輕身齒落更生髮白更黑方

天門冬與百部相似天門冬味甘兩頭方百部細長而味苦令人利擣絞取汁二斗清麴二升麴發以糯米二斗準家醞法造酒春夏極冷下飯秋冬溫如人肌醖之酒熟取清服一盞常令酒氣相接勿至醉吐慎生冷酢滑雞豬魚蒜特慎鯉魚亦忌油膩此是一

斗汁法餘一石二石亦準此以為大率服藥十日覺  
身體癢疹大癢二十日更大癢三十日乃漸止此皆  
是風氣出去故也四十日即覺身心朗然大快似有  
所得五十日更覺大快當風坐卧覺風不着人身中  
諸風悉盡用米法先淨淘米曝炕令乾臨欲用時更  
別取天門冬汁漬米乾漉炊之餘汁拌飯甚宜密封  
取天門冬汁法淨洗天門冬去心皮乾漉去水切去  
壓取汁三四遍令滓乾如草乃止此酒初熟味酸仍

作臭泔腥氣但依式服之久停則香美餘酒皆不及也封四七日佳凡八月九月即少少合至十月多合擬到來年五月三十日以來相續服之春三月亦得合入四月不得合服酒時若得散服得力更倍速散方如左

散方天門冬去心皮曝乾擣作末以上件酒服方寸七日三加至三七久服長生凡酒亦得服

灸法

大人癰小兒驚癇灸背第二椎及下窮骨兩處以繩度  
中折繩端一處是脊骨上也凡三處畢復斷繩作三折  
令各等而參合如么字以一角注中央灸下二角俠脊  
兩邊便灸之凡五處也故畫圖注以丹注所灸五處各  
百壯削竹皮為度勝繩也

卒癰灸陰莖上宛宛中三壯得小便通即瘥

千金翼云  
當尿孔上

是穴又灸陰莖頭三壯又灸足大趾上聚毛中七壯

又灸囊下縫二七壯又灸兩乳頭三壯又灸督脉三

十壯三報穴在直鼻中上入髮際 又灸天窻百會各  
漸灸三百壯炷惟小作 又灸耳上髮際各五十壯

論曰黃帝問曰有病怒狂者此病安生岐伯對曰生於  
陽曰陽何以使人狂曰陽氣因暴折如難決故善怒病  
名曰陽厥問曰何以知之對曰陽明常動太陽少陽不  
動不動而動大疾此其候也曰治之奈何曰衰其食即  
已夫食入于陰長氣於陽故奪之食即已使之服以生  
鐵落為後飯夫生鐵落者下氣疾

論曰凡發狂則欲走或自高賢稱神聖皆須備諸大灸  
乃得永瘥耳若或悲泣呻吟者此為邪非狂自依邪方  
治之邪入于陽則為狂邪入于陰則為血痺邪入于陽  
傳即為癰瘰邪入于陰傳則為痛痞陽入于陰病靜陰  
入于陽病怒

鼈甲湯治邪氣夢寐寤時涕泣不欲聞人聲體中酸削  
乍寒乍熱腰脊強痛腹中拘急不欲飲食或因疾病之  
後勞動疲極或觸犯忌諱衆諸不節婦人產生之後月

經不利時下青赤白肌體不生肉虛羸度小便不利或頭身發熱旋復解散或一度交接彌日因極皆主之方

鼈甲

七枚

甘草

白薇

一作白芷

貝母

黃芩

各二兩

麻黃

芍藥

白朮

各二兩半

防風

三兩

凝水石

桂心

茯苓

知母

各四兩

石膏

六兩

右十四味呖咀以水二斗煮取四升溫服一升日三夜一  
九物牛黃圓治男子沾鬼魅欲死所見驚怖欲走時有

休止皆邪氣所為不能自絕方

牛黃

土精一云火精

荆實

人精

曾青

蒼龍精

玉屑

白虎精

空青

天精

雄黃

地精

玄參

玄武精

龍骨

水精

赤石脂

朱雀精

右丸味名曰九精上通九天下通九地各一兩治下

篩蜜和丸如小豆先食服一九日三稍加以知為度

千金翼云凡邪病當服五邪湯九精九瘥

十黃散治五臟六腑血氣少亡魂失魄五臟覺不安忽



忽喜悲心中善恐怖如有鬼物此皆發于大驚及當風從高墮下落水所致悉主之方

雄黃

人參

各五分

黃芩

大黃

黃蘗

黃耆

細辛

桂心

各三分

黃連

黃昏

蒲黃

麻黃

各一分

黃環

澤瀉

山茱萸

各二分

右十五味治下節未食溫酒服方寸匕日三不知加至二匕羸劣者更加人參五分合十分一方有生黃

二分崔氏有蜀椒五分  
乾薑四分

別離散治男女風邪男夢見女女夢見男悲愁憂恚怒  
喜無常或半年數月一發動方

桂心

茵芋

天雄

菖蒲

細辛

茜根

附子

乾薑各一兩

白朮

桑上寄生

各三兩

右十味治下篩酒服方寸匕日三凡修合勿令婦人  
雞犬及病者家人知見令邪氣不去禁之為驗

四物鳶頭散治鬼魅方

東海鳶頭

即由跋根

黃牙石

一名金牙

葭蓂子

防葵

各一分

右四味治下篩酒服方寸匕欲令病人見鬼加防葵一分欲令知鬼主者復增一分立有驗防葵葭蓂並令人迷惑恍惚如狂不可多服

五邪湯治邪氣啼泣或歌或哭方

禹餘糧

防風

桂心

芍藥

遠志

獨活

甘草

白朮

人參

石膏

牡蠣

秦艽

各二兩

防己

菖蒲

茯神

雄黃

源師作黃丹

蛇蛻皮

各一兩

右十七味㕮咀以水二斗煮取四升分四服亦可如  
煮散法服之

茯神湯治五邪氣入人體中見鬼妄語有所見聞心悸  
跳動恍惚不定方

茯苓

人參

菖蒲

茯苓

各三兩

赤小豆

四十枚

右五味㕮咀以水一斗煮取二升半分三服

人參湯治風邪氣往來發作有時或無時節方

人參

防風

烏頭

乾薑

澤瀉

桔萋根

翼作桔梗

狗脊

遠志

附子

黃芩

獨活

各五分

秦朮

牡蠣

五味子

山茱萸

前胡

細辛

石膏

芎藭

蜀椒

牛膝

甘草

石南

桑根白皮

桂心

麻黃

竹皮

白朮

橘皮

各十銖

鬼箭

千金翼作澤蘭

茯苓

各十銖

大棗

十六枚

右三十二味㕮咀以水六升酒六升合煮取四升分

五服日三夜二

虎睛湯治狂邪發無常被髮大叫喚欲殺人不避水火方

虎睛

露蜂房

鵝頭

各一具

楓上寄生

五分

石長生

分十

茯苓

桂心

防風

兩各三

獨活

甘草

人參

天雄

兩各一

右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升分四服日

三夜一

又方

防葵

人參

貫衆

兩各五

防風

桂心

兩各三

右五味㕮咀以水一斗煮取三升分四服稍服亦可

又方苦參五升蜜和丸如酸棗大單服十丸

治卒發狂方

令患人著地仰卧以冷水終日淋其面良

治百邪鬼魅方

服頭垢小豆大

治魅方

以水服鹿角末方寸匕日三

治狐狸諸色精魅作種種惡怪令人恐怖狂癲風邪方



雄黃

六斤

油一斗  
二升

右二味破雄黃如碁子大鎔中以盆合頭作竈微火煎九日九夜不得少時火絕亦不得火冷須火熱微微不絕神驗

治風邪方

商陸根三十斤去皮細切以水八斗東向竈煎減半去滓更煎令可丸如梧子大服一丸合時勿令人見  
葭菰方及大豆紫湯皆可服汗出佳  
葭菰方出此篇前紫湯見別卷

又方燒蝦蟇末水服方寸七日三

又方燒人屎灰酒服慎生冷酢滑猪雞魚蒜等

又方以水服伏龍肝方寸七日三

治諸橫邪癩狂針灸圖訣

論曰凡諸百邪之病源起多塗其有種種形相示表癩邪之端而見其病或有默默而不聲或復多言而謾說或歌或哭或吟或笑或眠坐溝渠噉食糞穢或裸形露體或晝夜遊走或嗔罵無度或是蜚蠱精靈手亂目急

如斯種類癲狂之人今針灸與方藥並主治之

凡占風之家亦以風為鬼斷

扁鵲曰百邪所病者針有十三穴也凡針之體先從鬼宮起次針鬼信便至鬼壘又至鬼心未必須併針止五六穴即可知矣若是邪蠱之精便自言說論其由來住驗有實立得精靈未必須盡其命求去與之男從左起針女從右起針若數處不言便偏穴針也依訣而行針灸等處並備主之仍須依掌訣捻目治之萬不失一

黃帝掌訣別是術家秘要縛鬼禁劫五嶽四瀆山精鬼  
魅並悉禁之有目在人兩手中十指節間第一針人中  
名鬼宮從左邊下針右邊出第二針手大指爪甲下名  
鬼信入肉三分第三針足大指爪甲下名鬼壘入肉二  
分第四針掌後橫文名鬼心入半寸即大淵穴也第五針外  
踝下白肉際足太陽名鬼路火針七銍銍三下即申脉穴也  
第六針大椎上入髮際一寸名鬼枕火針七銍銍三下  
第七針耳前髮際宛宛中耳垂下五分名鬼牀火針七

銓銓三下第八針承漿名鬼市從左出右第九針手橫

文上三寸兩筋間名鬼路

即勞宮穴也

第十針直鼻上入髮

際一寸名鬼堂火針七銓銓三下

即上星穴也

第十一針陰

下縫灸三壯女人即玉門頭名鬼藏第十二針尺澤橫

文外頭接白肉際名鬼臣火針七銓銓三下

此即曲池穴也第

十三針舌頭一寸當舌中下縫刺貫出舌上名鬼封仍

以三板橫口吻安針頭令舌不得動已前若是手足皆

相對針兩穴若是孤穴即單針之

邪鬼妄語炎懸命十四壯穴在口脣裏中央絃絃者是

也

鬼一名祿

又用剛刀決斷絃絃者乃佳

邪病卧瞑瞑不自知風府主之

鬼一名穴

邪病大喚罵詈走灸十指端去爪一分

鬼一名城

邪病大喚罵走遠三里主之

鬼一名邪

邪病鬼癲四肢重顛上主之

鬼一名門

邪病四肢重痛諸雜候尺澤主之

尺中動脈一名鬼受

邪病語不止及諸雜候人中主之

一名鬼客廳

凡人中惡先

押鼻下是也

倉公法狂癰不識人癰病眩亂灸百會九壯 狂走掣

癰灸玉枕上三寸一法頂後一寸灸百壯 狂走癰疾

灸頂後二寸十二壯 狂邪鬼語灸天窻九壯 狂走

灸大幽百壯 狂言恍惚灸天樞百壯 狂走癰癰灸

季肋端三十壯 狂癰哭泣灸手逆注三十壯穴在左

右手腕後六寸 狂走驚癰灸河口五十壯穴在腕後

陷中動脈是

此與陽明同也

狂癰風癰吐舌灸胃管百壯不

針狂邪發無常被髮大喚欲殺人不避水火及狂言

妄語灸間使三十壯穴在腕後五寸臂上兩骨間

亦灸驚恐

歌哭

狂走喜怒悲泣灸臣覺

一作巨攪

隨年壯穴在背上甲

內側反手所不及者骨芒穴上捻之痛者是也

狂邪

鬼語灸伏兔百壯

前作天憲九憲

悲泣鬼語灸天府五十壯

悲泣邪語鬼忙歌哭灸慈門五十壯

狂邪驚癇病

灸承命三十壯穴在內踝後上行三寸動脉上

亦灸驚狂走也

狂癲風驚厥逆心煩灸巨陽五十壯 狂癲鬼語灸



足太陽四十壯 狂走驚恍惚灸足陽明三十壯 狂

癲癇易疾灸足少陽隨年壯 狂走癲厥如死人灸足

大趾三毛中九壯

翼云灸大敦

狂走易罵灸八會隨年壯

穴在陽明下五分 狂癲驚走風恍惚嗔喜罵笑歌哭

鬼語悉灸腦戶風池手陽明太陽太陰足陽明陽蹻少

陽太陰陰蹻足跟皆隨年壯 驚怖心忪少力灸大橫

五十壯 狂風罵詈撾斫人名為熱陽風灸口兩吻邊

燕口處赤白際各一壯 又灸陰囊縫三十壯令人立以

筆正注當下已卧核卵上灸之勿令近前中卵核恐害陽氣也 狂走刺人或欲自死罵詈不息稱神鬼語灸口吻頭赤白際一壯 又灸兩肘內屈中五壯 又灸背胛中間三壯報灸之倉公法神效 鬼魅灸入髮一寸百壯 又灸間使手心各五十壯 狐魅合手大指縛指灸合間三七壯當狐鳴即瘥 卒狂言鬼語以甌帶急合縛兩手大指便灸左右脇下對屈肋頭兩處火俱起各七壯須臾鬼自道姓名乞去徐徐問之乃解其手

卒中邪魅恍惚振噤灸鼻下人中及兩手足大指爪  
甲本令艾丸半在爪上半在肉上各七壯不止十四壯  
炷如雀屎大 風邪灸間使隨年壯 又灸承漿七壯  
又灸心輸七壯 又灸三里七壯 卒狂鬼語針其足  
大拇趾爪甲下入少許即止

備急千金要方卷四十四